


Megjegyzések:

- Ha a vizsgázó a sorsjegyek számát önkényesen választva helyesen oldja meg a feladatot, de nem utal arra, hogy ez nem megy az általánosság rovására, akkor ezért 1 pontot veszítsen.
 - Az egy darab kihúzott sorsjegyhez tartozó valószínűségek láthatók a faábrán.
- (Ennek alapján pl. $P(A) = 0,14 + 0,24 = 0,38$.)

**9. c)**

Az egy kék sorsjegyre jutó nyeremény várható értéke:

$$(0,4 \cdot 0) + 0,35 \cdot 500 + 0,2 \cdot 1000 + 0,05 \cdot 5000 =$$

$$= 625 \text{ Ft.}$$

Összesen: **3 pont**

2 pont

1 pont

3 pont

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. október 18.

MATEMATIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

- Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
- A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
- Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kippalással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
- Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy a **hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
- A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket.**
 - helyes lépés: *kippálás*
 - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
 - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
 - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott vagy áthúzott kippálás*
 - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
 - nem érthető rész: *kérdőjel és/vagy hullámvonal*
- Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

Tartalmi kérések:


- Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
- A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, ha csak az útmutató másképp nem rendelkezik.** Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
- Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
- Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkerészekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
- Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

9. a)			
(Ha a kék sorsjegy ára k Ft, a zöld sorsjegyé z Ft, akkor) $5k + 3z = 6700$ és $3k + 2z = 4200$.	1 pont		
Az első egyenlet kétszereséből a második egyenlet háromszorosát kivonva megkapjuk, hogy $k = 800$, egy kék sorsjegy ára tehát 800 Ft.	2 pont		
Amból $z = 900$, egy zöld sorsjegy ára tehát 900 Ft.	1 pont		
Ellenőrzés:			
5 kék és 3 zöld sorsjegy $4000 + 2700 = 6700$ Ft-ba, 3 kék és 2 zöld pedig $2400 + 1800 = 4200$ Ft-ba kerül.	1 pont		
Összesen: 5 pont	5 pont		
<i>Megjegyzés: Ha a vizsgázó a választai mértékegység nélkül adja meg, akkor ezért összesen 1 pontot veszíten.</i>			
9. b)			
Ha n db sorsjegy készült, akkor $0,4n$ db sorsjegy kék, és ezek 3,5%-a nyer tárgynyereményt. Annak valószínűsége, hogy a kihúzott sorsjegy kék, és tárgynyereményt nyer: $P(AB) = \frac{0,4n \cdot 0,35}{n} = 0,14$.	1 pont	$P(AB) = 0,4 \cdot 0,35 = 0,14$	
Az n db sorsjegy között $0,6n$ db zöld, és ezek 40%-a nyer tárgynyereményt. Annak valószínűsége, hogy a kihúzott sorsjegy zöld, és tárgynyereményt nyer: $\frac{0,6n \cdot 0,4}{n} = 0,24$.	1 pont	(A zöld sorsjegy húzása a B esemény.) $P(AB) = 0,6 \cdot 0,4 = 0,24$	
A tárgynyereményt nyerő sorsjegy vagy kék, vagy zöld (és ez két egymást kizáró esemény), ezért $P(A) = 0,14 + 0,24 = 0,38$ valóban.	1 pont	$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B}) = 0,14 + 0,24 = 0,38$	
$P(B A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,14}{0,38} = \frac{7}{19} \approx 0,368$	1 pont		
(A feladat szövegéből $P(B) = 0,4$) $P(A) \cdot P(B) = 0,38 \cdot 0,4 = 0,152$	1 pont	$P(B A) \neq P(B)$, vagy $P(A B) \neq P(A)$	
Mivel $P(A) \cdot P(B) \neq P(AB)$, ezért A és B nem független események.	1 pont		
Összesen: 8 pont	8 pont		

8. c) első megoldás	
Két élszomszédos csúcs nem lehet a három kiválasztott pont között, mert ezekhez akárhogy választunk harmadik csúcsot, az így meghatározott sík (lapsík vagy átlós sík) átmegegy negyedik csúcson is.	2 pont
A téglatestnek vagy az alap-, vagy a fedőlapjáról két csúcsot is ki kell választanunk, ezek tehát csak átlós csúcsok lehetnek. Ezt az alap- és a fedőlap esetében is 2-féleképpen tehetjük meg.	2 pont
Ezekhez a másik lapról úgy kell harmadik csúcsot választanunk, hogy egyikkel se legyen élszomszédos, ezt minden esetben 2-féleképpen tehetjük meg.	1 pont
A megfelelő kiválasztások száma tehát $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.	1 pont
Összesen:	6 pont

8. c) második megoldás	
(A komplementer leszámolás módszerét használjuk.)	
A 8 csúcs közül $\binom{8}{3} = 56$ -féleképpen választhatunk ki 3 csúcsot.	1 pont
Ha egy oldallap 3 csúcsát választjuk, az nem megfelelő választás, mert a negyedik csúcs is rajta van az oldallap síkján.	1 pont
Egy oldallapon 4-féleképpen választhatunk 3 csúcsot, ezért ez a $6 \cdot 4 = 24$ választás nem felel meg.	2 pont
Ugyanezzel a megfontolással látható be, hogy nem megfelelő az sem, ha a téglatest 6 átlós síkján lévő 4-4 csúcs közül választunk 3-at. Tehát itt is 24 nem megfelelő választás van.	1 pont
A maradék $56 - 24 - 24 = 8$ választás (a téglatest 8 csúcsából induló 3-3 él végpontja) megfelelő.	1 pont
Összesen:	6 pont

Megjegyzés: Ha a vizsgázó indoklás nélkül felsorolja a megfelelő kiválasztásokat (ACF, ACH, BDE, BDG, EGB, EGD, FHA, FHC – az ACFH és a BDEG tetraéder 4-4 lapsíkja), és ez alapján helyesen válaszol, akkor 4 pontot kapjon.



- Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
- A megoldásokért jutalompont (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) nem adható.
- Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám nem lehet negatív.
- Az olyan részszámításokért, részlépésekért nem jár pontlevonás, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
- A gondolatmenet kifejtése során a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytablázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek az átlag és a szórás kiszámítására abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, így azokért nem jár pont.
- Az ábrák bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása mérésrel) nem elfogadható.
- Valószínűségek megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százlékben megadott helyes válasz is elfogadható.
- Ha egy feladat szövege nem ír elő kerékítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadott eltérő, észszerű és helyes kerékítésekkel kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
- A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozathoz sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.


I.

1. a)		
A kör sugara $ \overline{CP} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ egység,	1 pont	
egyenlete $(x+6)^2 + (y+2)^2 = 25$.	1 pont	
Összesen:	2 pont	

1. b)		<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
Az érintő merőleges az érintési pontba húzott sugárra,	1 pont	
ezért az érintő egy normálvektora $\overline{CP}(3;4)$,	1 pont	
egyenlete $3x + 4y = -1$.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

1. c)		
A CP egyenes egy irányvektora $\overline{CP}(3;4)$,	1 pont	
egyenlete $4x - 3y = -18$.	1 pont	
(Az $y = 0$, majd $x = 0$ helyettesítésekkel kapjuk, hogy) az egyenes az x tengelyt a $(-4,5; 0)$, az y tengelyt pedig a $(0; 6)$ pontban metszi.	1 pont	
A Pitagorasz-tétellel adódik, hogy a derékszögű háromszög átfogója $\sqrt{4,5^2 + 6^2} = 7,5$ egység hosszú.	1 pont	
A derékszögű háromszög körülírt körének sugara az átfogó fele,	1 pont	<i>A háromszög területe 13,5,</i>

tehát 3,75 egység hosszú.	1 pont	<i>körülírt körének sugara az</i> $R = \frac{abc}{4T}$ $4,5 \cdot 6 \cdot 7,5 = 3,75$ egység. $4 \cdot 13,5$
Összesen:	6 pont	



8. a)		
A harmadik él hossza $\left(\frac{72}{4 \cdot 2} = 9\right)$ (dm),	1 pont	
a téglatest felszíne $(2 \cdot (4 \cdot 2 + 4 \cdot 9 + 2 \cdot 9) =) 124 \text{ dm}^2$.	1 pont	
Összesen:	2 pont	

8. b)		<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A téglatest élei (dm-ben mérve) $a, 2a$ és b ($a, b > 0$).	1 pont	
A szöveg alapján a térfogat: $72 = 2a^2b$, ahonnan $b = \frac{36}{a^2}$.	1 pont	
A téglatest felszíne (dm^2 -ben mérve): $4a^2 + 6ab = 4a^2 + \frac{216}{a}$.	1 pont	
Az $A: \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}; A(a) = 4a^2 + \frac{216}{a}$ függvény deriválható, $A'(a) = 8a - \frac{216}{a^2}$.	2 pont*	
Minimuma ott lehet, ahol $A'(a) = 0$. Ekkor $a = 3$.	1 pont*	
Mivel a második derivált az értelmezési tartomány minden elemére pozitív, ez valóban minimumhely.	1 pont*	$A''(a) = 8 + \frac{432}{a^3} > 0$
A minimális felszíniú téglatest élei 3 dm, 6 dm, illetve $(36 : 9 =) 4$ dm hosszúak.	1 pont	
Összesen:	8 pont	

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 4 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

$A(a) = 4a^2 + \frac{216}{a} = 4a^2 + \frac{108}{a} + \frac{108}{a}$	1 pont	
A számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenséget alkalmazva: $4a^2 + \frac{108}{a} + \frac{108}{a} \geq 3 \cdot \sqrt[3]{4a^2 \cdot \frac{108}{a} \cdot \frac{108}{a}} = 3 \cdot \sqrt[3]{46656} = 3 \cdot 36 = 108$.	1 pont	
Egyenlőség (vagyis minimális felszín) akkor és csak akkor lehetséges, ha $4a^2 = \frac{108}{a}$, amiből $a = 3$ (dm).	1 pont	
Összesen:	2 pont	

7. b)		
(A számokat a hozzájuk tartozó pontok betűjével je- löljük.)	1 pont	
Az A , B és C számok racionálisak $\left(\frac{1}{3^2}, \frac{1}{3^7}, \frac{1}{3^{12}}\right)$.		
Két racionális szám összege is racionális, ezért az ABC részgráf három éle be van húzva.		
A , D és E számok irracionálisak. (Két irracionális szám összege lehet racionális és irracionális is.)	2 pont	
$E = \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \frac{1}{\sqrt{2}-1} \cdot \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}+1$		
$D+E = 1-\sqrt{2}+\sqrt{2}+1 = 2$, tehát a DE él is be van húzva.		
Egy racionális és egy irracionális szám összege irra- cionális, ezért több él nincs.	1 pont	
A gráfnak tehát összesen 4 éle van.	1 pont	
Összesen:	5 pont	

Megjegyzés: Indoklás nélkül megadott helyes gráf és válasz esetén 2 pontot kapjon a vizsgázó.

7. c)		
A téglalapok számát az $\frac{1}{3^n} - \frac{1}{3^{n+1}} > 10^{-6}$ egyenlőlen- ség megoldásával kapjuk meg.	1 pont	
Az egyenlőtlenséget (a pozitív) 3^{n+1} -nel szorozva: $3 - 1 > 10^{-6} \cdot 3^{n+1}$, amiből $2 \cdot 10^6 > 3^{n+1}$.	1 pont	
Az $x \mapsto 3^x$ ($x \in \mathbf{R}$) függvény szigorúan monoton nö- vekedő,	1 pont	
így $\log_3(2 \cdot 10^6) \approx 13,2 > n + 1$,	1 pont	
tehát $n = 12$ a legnagyobb pozitív egész megoldás.	1 pont	
A 12 téglalap mindegyikének egyik oldala 1.		
Másik oldaluk hossza, és így a területük is egy olyan mértani sorozat első 12 tagja, amelyben $a_1 = a = \frac{1}{3}$.	1 pont	
$S_{12} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{12} - 1}{\frac{1}{3} - 1} \approx$	1 pont	
$\approx 0,5$ a téglalapok területének összege.	1 pont	
Összesen:	8 pont	

2. a) első megoldás		
$\cos x = 0$ nem megoldás (ekkor nem lehet $\sin x = 0$),	1 pont	
ezért az egyenlet ekvivalens a $\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 3$,	1 pont	
azaz a $\operatorname{tg}^2 x = 3$ egyenlettel.		
$\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$ vagy $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$.	2 pont	
$\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$ esetén $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$,	2 pont	
$\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$ esetén $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$.		
Összesen:	6 pont	

2. a) második megoldás		
A $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ azonosság felhasználásával,	1 pont	
az egyenlet ekvivalens az $\frac{1}{4} = \cos^2 x$ egyenlettel.	1 pont	
$\cos x = \frac{1}{2}$ vagy $\cos x = -\frac{1}{2}$.	2 pont	
$\cos x = \frac{1}{2}$ esetén $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$,	2 pont	$x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ vagy
$\cos x = -\frac{1}{2}$ esetén $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$.		$x = -\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$
Összesen:	6 pont	

Megjegyzések:

- Ha a vizsgázó a megoldásokat fokban helyesen adja meg, akkor legfeljebb 5 pontot kaphat.
- Ha a vizsgázó választát periódus nélkül adja meg, akkor legfeljebb 4 pontot kaphat.
- Ha a vizsgázó periódussal adja meg az egyenlet megoldásait, de a $k \in \mathbf{Z}$ feltételt egyszer sem említi, akkor legfeljebb 5 pontot kaphat.

2. b)		
Az egyenlet értelmezési tartománya: $x > 2$.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó behelyettesítéssel ellenőriz.</i>
(A logaritmus definíciója és azonosságai alapján) $\log_3 \frac{(x+8)(x-2)}{x+4} = \log_3 3$.	2 pont	
(A logaritmusfüggvény kölcsönös egyértelműsége miatt) $\frac{(x+8)(x-2)}{x+4} = 3$.	1 pont	
Nullára rendezve $x^2 + 3x - 28 = 0$.	1 pont	
Ennek a gyökei a 4 és a -7 .	1 pont	
melyek közül csak a 4 megoldás (mert $-7 \leq 2$).	1 pont	
Ellenőrzés behelyettesítéssel, vagy az értelmezési tar- tományon ekvivalens átalakításokra hivatkozással.	1 pont	
Összesen:	8 pont	

3. a)	24 db töltő adatait tartalmazza a kördiagram, tehát az egy töltőnek megfelelő középponti szög 15° . A 24 töltő élettartama táblázatban:	1 pont														
	<table border="1"> <tr> <td>élettartam (hónap)</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>51</td> <td>52</td> <td>53</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>darabszám</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </table>	élettartam (hónap)	49	50	51	52	53	54	darabszám	2	4	7	4	5	2	1 pont
élettartam (hónap)	49	50	51	52	53	54										
darabszám	2	4	7	4	5	2										
	A 24 töltő élettartamának átlaga: $2 \cdot 49 + 4 \cdot 50 + 7 \cdot 51 + 4 \cdot 52 + 5 \cdot 53 + 2 \cdot 54 =$ 24 $= 51,5$ (hónap).	1 pont														
	Az élettartamok szórása: $\sqrt{\frac{2 \cdot (49 - 51,5)^2 + \dots + 2 \cdot (54 - 51,5)^2}{24}}$ $= \sqrt{\frac{4 \cdot 2,5^2 + 9 \cdot 1,5^2 + 11 \cdot 0,5^2}{24}}$ $= \sqrt{2}$ ($\approx 1,41$) (hónap).	1 pont														
	Összesen:	5 pont														

3. b)	Annak a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott töltő élettartama 50 hónapnál kevesebb ($1 - 0,9 \Rightarrow 0,1$).	1 pont
	(jelölje $P(n)$ annak valószínűségét, hogy a 20 töltő között n db élettartama lesz 50 hónapnál kevesebb.) $P(0) = 0,9^{20}$ ($\approx 0,122$) $P(1) = \binom{20}{1} \cdot 0,1 \cdot 0,9^{19}$ ($\approx 0,270$) $P(2) = \binom{20}{2} \cdot 0,1^2 \cdot 0,9^{18}$ ($\approx 0,285$)	2 pont
	A kérdezett valószínűség tehát $P(0) + P(1) + P(2) \approx 0,677$.	1 pont
	Összesen:	5 pont

3. c)	Ha p jelöli annak a valószínűségét, hogy egy töltő élettartama legalább 55 hónap, akkor $(1 - p)^5 = 0,75$. Innen $1 - p$ ($= \sqrt[5]{0,75}$) $\approx 0,944$, a kérdezett valószínűség tehát $p \approx 0,056$.	1 pont
	Összesen:	3 pont


6. c) első megoldás	A 15 liter egy olyan szabályos háromszög alapú hasáb térfogata, melynek magassága 72 cm, így az alaplapjának területe $\frac{15000}{72} \approx 208,3$ (cm ²).	1 pont
	Az alaplap szabályos háromszög, oldala legyen x cm. $x^2 \cdot \sqrt{3} \approx 208,3$ 4 Ebből $x \approx 21,9$ (cm),	1 pont
	ezért a kérdezett magasság $x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 19$ cm.	1 pont
	Összesen:	5 pont


6. c) második megoldás	Azonos alapú, azonos magasságú gúla és hasáb térfogatának aránya 1:3, ezért a vályúban maradt víz térfogata a vályú térfogatának a harmada, így a vízzel kitöltött (azonos magasságú) hasáb alapterülete is harmada az eredetinek. A két hasáb alaplapja hasonló, a hasonlóság aránya $\frac{1}{\sqrt{3}}$.	1 pont
	A vályúban maradt víz szintjének magassága tehát $\left(38 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 19$ cm.	1 pont
	Összesen:	5 pont

7. a)	$f(-2) = 3^{-(-2)} = 9 \in \mathbf{N}$	1 pont
	$f(0,5) = 3^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \in (\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q})$	1 pont
	$f(5) = 3^{-5} = \frac{1}{3^5} = \frac{1}{243} \in (\mathbf{Q} \setminus \mathbf{Z})$	1 pont
	Összesen:	3 pont

Megjegyzések:

- Ha a vizsgázó a megoldását nem indokolja (a kiszámított függvényértékeket nem tünteti fel), akkor legfeljebb 2 pontot kaphat.
- Ha a vizsgázó megoldásában az $x \mapsto 3^x$ függvénnyel dolgozik, akkor legfeljebb 2 pontot kaphat.




6. a)	 <p>Az ABC háromszög területe $\frac{126 \cdot 65 \cdot \sin 122,5^\circ}{2} \approx 3454 \text{ (m}^2\text{)}.$</p>	1 pont
	Az AC átló hossza az ABC háromszögből koszinusz-tételrel:	1 pont
	$AC = \sqrt{126^2 + 65^2 - 2 \cdot 126 \cdot 65 \cdot \cos 122,5^\circ} \approx 170 \text{ (m)}.$	
	Az ADC derékszögű háromszögből Pitagorasz-tétel-lel: $AD = \sqrt{170^2 - 80^2} = 150 \text{ (m)}.$	1 pont
	Az ADC háromszög területe $\frac{AD \cdot DC}{2} = \frac{150 \cdot 80}{2} = 6000 \text{ (m}^2\text{)}.$	1 pont
	A legelő területe $(3454 + 6000) = 9454 \text{ m}^2 = 0,9454 \text{ ha}.$	1 pont
	0,9454 : 0,9 $\approx 1,05$, tehát a legelő valódi területe kb. 5%-kal nagyobb a meghirdetetténél.	1 pont
	Összesen:	6 pont

6. b)	A megdöntött vályúban maradt víztömeg alakja olyan szabályos háromszög alapú gúla, amelynek alapéle 38 cm, magassága 72 cm hosszú.	2 pont
	A szabályos háromszög területe $t = \frac{38^2 \cdot \sqrt{3}}{4} (\approx 625,3) \text{ (cm}^2\text{)}.$	1 pont
	A vályúban maradó víz térfogata $\frac{t \cdot 72}{3}$, azaz kb. 15 006 cm ³ , ami a kért kerekítéssel valóban 15 liter.	1 pont
	Összesen:	5 pont

Megjegyzés: A vályú térfogata kb. 45 000 cm³ (2 pont), a gúla térfogata ennek a harmada (1 pont), vagyis 15 000 cm³ (1 pont), ami valóban 15 liter (1 pont).

4. a)	$f(0) = \sin 0 = 0, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$ $g(0) = \left(\frac{0}{\pi}\right)^2 = 0, g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{2 \cdot \frac{\pi}{2}}{\pi}\right)^2 = 1$ (Tehát az állítás igaz.)	3 pont
	Összesen:	3 pont
4. b)	(Mivel az adott intervallumban $f(x) \geq g(x)$, ezért) a síkidom területe:	1 pont
	$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin x - \left(\frac{2x}{\pi}\right)^2 \right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin x - \frac{4}{\pi^2} \cdot x^2 \right) dx =$ $= \left[-\cos x - \frac{4}{\pi^2} \cdot \frac{x^3}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} =$ $= \left(-0 - \frac{\pi}{6} \right) - \left(-1 - 0 \right) =$ $= -\frac{\pi}{6} + 1 (\approx 0,476).$	2 pont
		1 pont
		1 pont
	Összesen:	5 pont



4. c)	$a_n = \frac{2}{n} + 2\pi$	1 pont
	A $\left\{ \frac{2}{n} \right\}$ sorozat szigorúan monoton csökkenő, 2π pedig állandó, ezért az a_n sorozat is szigorúan monoton csökkenő.	1 pont
	A sorozat felülről korlátos, mert a csökkenő sorozat első tagja egy felső korlát; alulról is korlátos, mert a sorozat mindegyik tagja pozitív (ezért például a 0 egy alsó korlátja a sorozatnak).	1 pont*
	A $\left\{ \frac{2}{n} \right\}$ sorozat határértéke 0,	1 pont
	ezért a megadott sorozat határértéke $(0 + 2\pi) = 2\pi$.	1 pont
	Összesen:	5 pont

$a_{n+1} - a_n = \frac{-2}{n(n+1)}$
 Ez mindig negatív, tehát a sorozat szigorúan monoton csökkenő.

A sorozat legkisebb felső korlátja $2 + 2\pi$, legnagyobb alsó korlátja pedig 2π .

Megjegyzés: A *-gal jelölt pont akkor is jár, ha a vizsgázo először belátja, hogy a megadott sorozat konvergens, majd hivatkozik arra, hogy ebből következik a sorozat korlátosságára.


II.

5. a) első megoldás	
(Az A, B, D tartományok páronként szomszédosak, ezért) az A 4-féleképpen, a B 3-féleképpen, a D pedig 2-féleképpen színezhető.	1 pont
Igy az A, B, D tartományok lehetséges színezéseinek száma $4 \cdot 3 \cdot 2 (= 24)$.	1 pont
Feltehetjük, hogy pl. A piros, B kék, D zöld. Ekkor C nem lehet sem piros, sem kék (tehát sárga vagy zöld lehet).	1 pont
Ha C sárga, akkor E csak piros lehet, és F színe 2-féle lehet (kék vagy sárga). Ekkor tehát E és F összesen 2-féleképpen színezhető.	1 pont
Ha C zöld, akkor E színe 2-féle lehet (piros vagy sárga), és mindkét esetben F is 2-féleképpen színezhető (ha E piros, akkor F kék vagy sárga, ha E sárga, akkor F piros vagy kék). Az E és az F megfelelő színezéseinek száma ekkor 2 · 2.	1 pont
Összesen tehát $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (2 + 2) = 144$ megfelelő színezés van.	1 pont
Összesen:	7 pont

5. a) második megoldás	
(Az A, B, D tartományok páronként szomszédosak, ezért) az A 4-féleképpen, a B 3-féleképpen, a D pedig 2-féleképpen színezhető.	1 pont
Igy az A, B, D tartományok lehetséges színezéseinek a száma $4 \cdot 3 \cdot 2 (= 24)$.	1 pont
Feltehetjük, hogy A piros, B kék, D zöld. Ekkor az E csak 2-féleképpen színezhető (piros vagy sárga). Az E színének megválasztása után az F is csak 2-féleképpen színezhető (mert szomszédos D-vel és E-vel).	1 pont
Ha a C lehetne piros is, akkor (az A, B, D, E, F színének megválasztása után) C-t is 2-féleképpen lehetne színezni (mert szomszédos B-vel és E-vel), vagyis összesen $2 \cdot 2 \cdot 2 (= 8)$ -féle folytatása lenne az A piros, B kék, D zöld színezésnek.	1 pont
Ha A piros, B kék, D zöld, akkor rossz színezések azok, amelyekben a C színe piros. Ekkor az E csak sárga lehet, F színe pedig 2-féleképpen választható (piros vagy kék), így összesen 2 rossz színezés van.	1 pont

Ha az összes eset számából $(4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2)$ levonjuk a rossz esetek számát $(4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2)$, akkor a megfelelő színezések számát kapjuk meg.	1 pont
A megfelelő színezések száma $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (8 - 2) = 144$.	1 pont
Összesen:	7 pont

Megjegyzés: Ha a tartományokat egy gráf csúcsainak tekintjük, és a „szomszédosságot” a gráfban a két megfelelő csúcsot összekötő éllel jelenítjük meg, akkor a feladat átfogalmazható úgy, hogy gráf csúcsait kell helyesen színezni (helyes színezés esetén az éllel összekötött csúcsok színe különböző). A szövegnek megfelelő gráf:



5. b)		
(B, E, F számokat kifejezzük C segítségével.)	1 pont	(1) és (2) szerint ha $B = 6 + m$, akkor $C = 6 + 2m$.
(1) és (2) szerint $B = \frac{6+C}{2}$.		
(5) szerint $E = C + 2$,	1 pont	továbbá (5) miatt $E = 8 + 2m$, és (4) miatt $F = 7 + m$.
(3) és (1) szerint pedig $F = \sqrt{DE} = \sqrt{8(C+2)}$.		
Végül (4) szerint $F = B + 1$, azaz $\sqrt{8(C+2)} = \frac{6+C}{2} + 1$.	1 pont	(1) és (3) miatt $F = \sqrt{8(8+2m)}$, így $\sqrt{8(8+2m)} = 7 + m$
A jobb oldalon közös nevezőre hozva, majd négyzetre emelve: $8(C+2) = \frac{64+16C+C^2}{4}$.	1 pont	$8(8+2m) = (7+m)^2$ $64+16m = 49+14m+m^2$
4-gyel való szorzás után nullára rendezve: $0 = C^2 - 16C$.	1 pont	$m^2 - 2m - 15 = 0$
Az egyenlet gyökei $C = 0$ és $C = 16$.	1 pont	$m = -3$ vagy $m = 5$
Az első esetben az ismeretlen számok: $B = 3, C = 0, E = 2, F = 4$.	1 pont	
A második esetben az ismeretlen számok: $B = 11, C = 16, E = 18, F = 12$.	1 pont	
Ellenőrzés a szövegbe helyettesítéssel.	1 pont	
Összesen:	9 pont	